

CATALOGUE DES OISEAUX

Observés par EMILE ANFRIE,
de 1860 à 1900, dans la région Lexovienne, comprenant seulement
l'arrondissement de Lisieux avec une partie limitrophe
de celui de Pont-l'Evêque

Les espèces citées — du moins toutes celles à sa connaissance — ont
été recueillies et sont représentées par plusieurs exemplaires
dans sa Collection ornithologique.

Carnassiers diurnes.

- 1 Aigle pygargue (*Haliaetus albicilla*, Leach) de passage accidentel.
Un exemplaire fut abattu le 20 novembre 1860, à Marolles,
par M. Doisnel.
- 2 Buse commune ou variable (*Buteo vulgaris*, Bechst.), assez com-
mune en hiver.
- 3 — pattue (*Archibuteo lagopus*, Brehm), de passage et rare.
- 4 — bondrée (*Pernis apivorus*, Bonap.), se rencontre souvent.
- 5 Milan royal (*Milvus regalis*, Briss.), peu commun.
- 6 — noir (— *niger*, —), très rare.
- 7 Faucon pèlerin ou commun (*Falco communis*, Gmel.), assez rare.
- 8 — hobereau (*Falco subbuteo*, Linn.), assez rare.
- 9 — émerillon (— *lihofalco*, Gmel.), se voit plus souvent.
- 10 — cresserelle, vulgo Emouchet (*Falco tinnunculus*, L.),
commun.
- 11 Autour ordinaire (*Astur palumbarius*, Bechst.), peu commun.
- 12 Epervier ordinaire, v. Tiercelet (*Accipiter nisus*, Pallas), commun.
- 13 Busard harpaye ou de marais (*Circus ariginosus*, Sav.), assez rare.
- 14 — St-Martin, v. Ecoufle (*Circus cyaneus*, Boie), se voit en
plaine.
- 15 — cendré ou de Montagu (*Circus cineraceus*, Naum.), se
voit en plaine.

Les Oiseaux de proie diurnes se nourrissant de gibier et
parfois de jeunes volailles sont à éliminer, sauf pourtant le
Faucon cresserelle (Emouchet rouge), dont l'espèce est à
conservé, il ne s'occupe exclusivement que des Campagnols
ou Mulots des champs qu'il détruit en grand nombre. Les
Buses aussi rendent de grands services par la quantité de
Rats, Mulots et Reptiles qu'elles consomment, sans les dis-
tinguer, malheureusement, des jeunes Lévrants et Lapereaux.

Carnassiers nocturnes.

- 16 Chouette chevêche, v. Chouette des pommiers (*Noctua minor*,
Briss.), commune.
- 17 — hulotte ou Chat-Huant (*Syrnium aluco*, Brehm), assez
commune.
- 18 — effraye ou frésaye (*Strix flammea*, L.), assez commune,

- 19 Hibou brachyote (*Otus brachyotus*, Boie), moins répandu.
- 20 — moyen-Duc (*Otus vulgaris*, Flemm.), — —
Les Chouettes et les Hiboux ne présentent pas la mort
malgré un préjugé superstitieux encore trop répandu. Ce
sont des espèces de première utilité pour la chasse nocturne
des petits rongeurs qu'ils détruisent par milliers dans nos
greniers, nos plaines et nos bois. Nous les en récompensons
en les exterminant !!!

Omnivores.

- 21 Corneille noire (*Corvus corone*, Linn.), commune.
- 22 — mantelée (*Corvus cornix*, L.), de passage d'octobre à
février.
- 23 Corbeau freux (*Corvus frugilegus*, L.), commun.
- 24 — choucas, v. Coraillon (*Corvus monedula*, L.), une
colonie d'une vingtaine de couples environ habite toute
l'année chacune des tours Saint-Pierre et Saint-Jacques.
Les Corbeaux sont utiles et nuisibles à la fois, ils com-
mettent de grands dégâts dans les champs en détarrant les
semences, mais ils consomment en même temps beaucoup
de vers blancs et de hannetons ; de là, leur protection ou
leur proscription selon les régions.
- 25 Casse-noix ordinaire (*Nucifraga caryocatactes*, Tem.), passage
accidentel
- 26 Pie ordinaire (*Pica caudata*, Linn.), commune et plutôt nuisible.
- 27 Geai ordinaire (*Garrulus glandarius*, Vieill.), commun et plutôt
nuisible.
- 28 Etourneau vulgaire (*Sturnus vulgaris*, L.), très commun, ne rend
que des services.

Insectivores

- 29 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*, L.), assez rare, de passage
en hiver.
- 30 — rousse (*Lanius rufus*, Briss.), assez rare, de passage
en été.
- 32 Mésange grosse charbonnière (*Parus major*, L.), commune.
- 33 — noire ou petite charbonnière (*Parus ater*, L.), beaucoup
moins répandue.
- 34 — bleue (*Parus caeruleus*, L.), très commune.
- 35 — huppée (*Parus cristatus*, L.), plus rare, suivant les
localités.
- 36 — nonnette vulgaire (*Picicle communis*, Gerbe), assez
commune.
- 37 — à longue queue (*Orites caudatus*, Gray), commune.
- 38 Roitelet huppé (*Regulus cristatus*, Charlet), commun, de passage
en hiver.
- 39 — à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*, Licht.), moins
répandu, de passage en hiver.

- 40 Sitelle torche-pot, v. Martinet (*Sitta caesia*, Mey. et Wolf.), commune.
 41 Grimpereau indigène (*Certhia familiaris*, Tem.), commun.
 42 Tichodrome échelette ou Grimpereau de muraille (*Tichodroma muraria*, Illig.), accidentel.

Cette rare espèce a été tuée en ville le 20 octobre 1873, sur un mur, au Camp-Franc.

Si nous exceptons les Pics-grièches, qui se nourrissent habituellement de gros insectes, mais aussi quelquefois de petits oiseaux, toutes ces espèces sont de précieux auxiliaires, surtout pour nos horticulteurs. Les Mésanges et le Grimpereau qui fréquentent souvent nos jardins, y détruisent avec une activité sans relâche, des légions de chenilles et d'insectes.

- 43 Pic-vert, v. Pleu-pleu (*Gecinus viridis*, Boie), commun.
 44 Pic-épeiche, v. Epec (*Picus major*, L.), moins répandu.
 45 Pic-épeichette, v. petit Epec (*Picus minor*, L.), moins répandu.
 46 Torcol vulgaire, v. Teureou (*Yunx torquilla*, L.), moins répandu.

Les Pics sont encore des oiseaux très utiles quoique méconnus, ils débarrassent l'écorce des arbres, des insectes et larves qui les rongent et ne percent jamais de trous pour nicher, que dans les arbres déjà creux et en décomposition partielle; leurs services sont donc entièrement gratuits.

- 47 Coucou gris (*Cuculus canorus*, L.), assez commun, de passage en été.

Le Coucou, essentiellement insectivore, ne vit — c'est peut-être le seul — presque que de chenilles velues qu'on trouve toujours en quantité dans son jabot. Il ne recherche pas les œufs des autres oiseaux, comme à tort on le prétend. Est-ce nécessaire de dire qu'il ne change pas d'espèce et qu'à la mi-juillet, il ne devient pas Tiercelet, selon le dicton, mais s'il ne chante plus vers cette époque, il est encore là et ne disparaît qu'en septembre.

- 48 Rollier ordinaire (*Coracias garrula*, L.), de passage accidentel.
 49 Martin-pêcheur vulgaire (*Alcedo ispida*, L.), assez commun.
 50 Huppe vulgaire (*Upupa epops*, L.), peu commun.
 51 Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*, L.), commune.
 52 — de fenêtre (*Chelidon urbica* Boie), —
 53 Hirondelle de rivage (*Cotyle riparia*, Boie). Une colonie qui est en diminution depuis quelques années, est établie à Ouilley-le-Vicomte, sur les berges de la *Touques*, près la propriété de M. Groult.
 54 Martinet noir (*Cypselus apus*, Illig.), très répandu en ville.
 55 Engoulevent d'Europe v. Crapaud volant (*Caprimulgus europæus*, L.), peu commun.
 56 Gobe-mouches gris (*Butalis grisola*, Boie), commun, de passage en été.
 57 Rousserolle turdoïde (*Calamoherpe turdoïdes*, Boie), rare, de passage en été.

- 58 Phragmite des joncs ou Fauvette des roseaux (*Calamodyta phragmitis*, M. et W.), commun.
 59 — aquatique ou Fauvette des roseaux (*Calamodyta aquatica*, Bp.), rare.
 60 Troglodyte mignon, v. Rebetin (*Troglodytes parvulus*, Koch), très commun.
 61 Hipolais lusciniolé (*Hipolais polyglotta*, Gerbe), assez rare.
 62 Pouillot sifleur (*Phyllopneuste sibilatrix*, Bp.), peu commun.
 63 — fitis (*Phyllopneuste trochylus*, Bp.), très commun.
 64 — veloce (*Phyllopneuste rufa*, Bp.), commun.

Toutes ces espèces ne vivent que d'insectes et ont droit à notre protection. Le Martin-pêcheur seul pourrait faire exception, mais il ne s'empare que de tout petits poissons et on peut lui pardonner ces légers méfaits; d'ailleurs, l'espèce devenant de moins en moins nombreuse, la rare beauté de son plumage, unique dans nos climats, devrait plutôt faire respecter les individus qui nous restent.

- 65 Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*, Scop.), commune, en été.
 66 — des jardins (*Sylvia hortensis*, Lath.), peu répandue, en été.
 67 — babillarde (*Sylvia garrula*, Briss.), rare, en été.
 68 — grisette (*Sylvia cinerea*, Briss.), la plus commune, en été.
 69 Lorient jaune (*Oriolus galbula*, L.), peu commun, en été.
 70 Grive musicienne (*Turdus musicus*, L.), commune.
 71 — draine ou de gui (*Turdus viscivorus*, L.), assez commune.
 72 — mauvais (*Turdus eleucus*, L.), de passage en hiver.
 73 — litorne v. Claquard (*Turdus pilaris*, L.), assez commune, en hiver.
 74 Merle noir (*Turdus merula*, L.), commun.
 75 — à plastron blanc (*Turdus torquatus*, L.), assez rare, de passage.

Les Fauvettes, les Lorient, les Grives et les Merles qui vivent à l'ordinaire d'insectes et de vers, y ajoutent aussi des baies dans la saison; ces oiseaux chanteurs se paient en nature sur nos arbres fruitiers.

- 76 Traquet motteux, v. Cul-blanc (*Saxicola œnanthe*, Bechst.), assez commun.
 77 — tarier (*Pratincola rubetra*, Koch), très commun en prairie, en été.
 78 — rubicole ou pâtre (*Pratincola rubicola*, Koch), commun, en été, on le voit parfois dans les hivers doux.
 79 Accenteur mouchet, v. Bunette (*Accentor modularis*, Bechst.), commun et sédentaire.
 80 Rossignol ordinaire (*Philomela lusciniæ*, Selby), devient assez rare.
 81 Rouge-queue de muraille (*Ruticilla phœnicura*, Bp.), commun, en été.
 82 Rouge-gorge (*Rubecula familiaris*, Blith), très commun.
 83 Gorge-bleue (*Cyanocula succica*, Brehm), de passage accidentel.

- 84 Bergeronnette grise, v. Batte-lessive (*Motacilla alba*, L.), très commune.
- 85 — Yarrell, v. Batte-lessive (*Motacilla Yarrellii*, Gould), de passage au printemps.
- 86 — boarule, v. Lavandière (*Motacilla sulphurea*, Bechst.), assez commune.
- 87 — printannière (*Budytes flava*, Bp.), assez rare.
- 88 — de Ray (*Budytes Rayi*, Bp.), commune en été.
- 89 Pipi spioncelle (*Anthus spinoletta*, Bp.), assez commun, de passage en hiver
- 90 — obscur (*Anthus obscurus*, Keys et Blas.), rare, de passage en hiver.
- 91 — farlouse des prés (*Anthus pratensis*, Bechst.), très commun en prairie.
- 92 — farlouse des arbres (*Anthus arboreus*, Bechst.), de passage en été.
- 93 Alouette des champs (*Alauda arvensis*, L.), très abondante.
- 94 — lulu (*Alauda arborea*, L.), moins commune.

Toutes ces espèces ne s'occupant que d'insectes, doivent être protégées.

Granivores.

- 95 Bruant de neige (*Emberiza nivalis*, L.), de passage accidentel en hiver.
- 96 — proyer (*Emberiza miliaris*, L.), peu commun, de passage.
- 97 — jaune, appelé à tort Verdier (*Emberiza citrinella*, L.), commun.
- 98 — zizi ou des haies (*Emberiza cirrus*, L.), plus rare et de passage.
- 99 — de roseaux (*Emberiza schoeniclus*, L.), assez commun.
- 100 Sizerin cabaret (*Linaria rufescens*, Vieill.), assez rare et de passage.
- 101 Tarin ordinaire (*Fringilla spinus*, L.), commun, de passage en hiver.
- 102 Chardonneret (*Fringilla carduelis*, L.), assez commun.
- 103 Linotte ordinaire (*Fringilla cannabina*, L.), assez commun.
- 104 Pinson ordinaire (*Fringilla celebs*, L.), très commun.
- 105 — d'Ardennes (*Fringilla montifringilla*, L.), de passage en hiver.
- 106 Gros-bec ordinaire (*Coccythraustes vulgaris*, Vieil.), peu commun.
- 107 Bec-croisé ordinaire (*Loxia curvirostra*, L.), assez rare, de passage en hiver.
- 108 Bouvreuil vulgaire (*Pyrrhula vulgaris*, Tem.), assez commun.
- 109 Verdier ordinaire (*Fringilla chloris*, Tem.), commun.
- 110 Moineau domestique (*Passer domesticus*, Briss.), très commun.
- 111 — friquet (*Passer montanus*, Briss.), moins répandu.

Les Gros-becs recherchent principalement les petites graines, mais ils font aussi une grande consommation de

chenilles et d'insectes, surtout pour leurs petits. Les services qu'ils rendent balancent, à peu près, les dégâts que certaines espèces, comme les moineaux, occasionnent quelquefois dans les récoltes, par leur grand nombre.

Pigeons.

- 112 Colombe ramier (*Columba palumbus*, L.), assez commun.
- 113 Tourterelle vulgaire (*Columba turtur*, L.), assez commune, de passage en été.

Gallinacés.

- 114 Perdrix grise (*Starna cinerea*, Bonap.), commune.
- 115 Caille commune (*Coturnix communis*, Bonat.), commune, de passage en été.

Echassiers.

- 116 Outarde barbue (*Otis tarda*, L.), de passage très accidentel. Un individu fut trouvé mort par un coup de feu, dans la plaine, le 4 janvier 1880, à Saint-Cyr-du-Roncerau.
- 117 Pluvier doré (*Charadrius pluvialis*, L.), peu commun, de passage en hiver.
- 118 — à collier (grand) (*Charadrius hiaticula*, L.), rare, de passage en hiver.
- 119 Vanneau huppé (*Vanellus cristatus*, Mey. et Wolf.), commun, de passage en hiver.
- 120 Recurvirostre avocette (*Recurvirostra avocetta*, L.), rare, de passage accidentel.
- 121 Barge commune (*Limosa melanura*, Tem.), assez rare, de passage accidentel.
- 122 Chevalier gambette ou à pieds rouges (*Totanus calidris*, Bechst.), assez rare, de passage.
- 123 — cuif-blanc (*Totanus ochropus*, Tem.), moins rare, de passage.
- 124 — guignette, v° Petite de mer (*Totanus hypoleucos*, Deg.), commun, de passage.
- 125 Combattant variable (*Macheles pugnax*, Cuv.), rare, de passage.
- 126 Bécasseau cincle, v. Alouette de mer (*Tringa cinclus*, L.), assez rare, de passage.
- 127 — minule, v. Alouette de mer (*Tringa minuta*, Tem.), rare, de passage.
- 128 Bécassine sourde, v. Bécasson (*Scolopax gallinula*, L.), assez commune, de passage en hiver.
- 129 — ordinaire (*Scolopax gallinago*, L.), assez commune, de passage en hiver.
- 130 — double (*Scolopax major*, Gmel.), rare, de passage en hiver.
- 131 Bécasse ordinaire (*Scolopax rusticola*, L.), assez commune, de passage en hiver.

- 132 Courlis cendré (*Numenius arquata*, Lath.), peu commun, de passage en hiver.
133 — courlieu, v. Livergin (*Numenius phaeopus*, Lath.), rare, de passage en hiver.
134 Cigogne blanche (*Ciconia alba*, Briss.), de passage accidentel.
135 Spatule blanche (*Platalaea leucorodia*, L.), de passage accidentel.
136 Héron cendré (*Ardea cinerea*, L.), peu répandu, de passage en hiver.
137 — butor (*Ardea stellaris*, L.), peu répandu, de passage en hiver.
138 — blongios, v. petit Butor (*Ardea minuta*, L.), plus rare, de passage en hiver.
139 Râle d'eau (*Rallus aquaticus*, L.), assez commun, sédentaire.
140 — de genêt (*Rallus crex*, L.), assez commun, de passage en été.
141 — marouette (*Rallus porzana*, L.), rare, de passage en automne.
142 — de Baillon (— *Baillonii*, Vieil.), rare, de passage en automne.
143 — poussin (*Rallus pusillus*, Pall.), rare, de passage en automne.
144 Poule d'eau ordinaire (*Gallinula chloropus*, Lath.), commune, sédentaire.
145 Foulque macroule, v. Morelle ou Judelle (*Fulica atra*, L.), rare, de passage.
146 Phalarope platyrhynque (*Phalaropus platyrhynchus*, Tem.), passage accidentel.

Palmipèdes.

- 147 Hirondelle de mer épouvantail (*Sterna fessipes*, L.), assez rare, de passage.
148 Mouette rieuse, v. Mauve (*Larus ridibundus*, L.) plus souvent, de passage.
Tous les ans, cette espèce remonte la *Touques*, jusqu'au Petit-Malheur.
149 Mouette tridactyle (*Larus tridactylus*, L.), de passage dans les gros temps.
150 — cendrée ou à pieds bleus (*Larus canus*, L.) de passage dans les gros temps.
151 Goéland à manteau bleu, v. Margas (*Larus argentatus*, L.), de passage accidentel.
152 Stercoraire longicaude (*Stercorarius longicaudus*, Briss.), de passage très accidentel.
Un individu fut capturé presque mort, le 18 Octobre 1879 à Cernay.
153 Fou de Bassan (*Sula Bassana*, Briss.), très accidentel.
Cet oiseau fut abattu sur la *Touques*, à Coquainvillers, le 9 Novembre 1895, après une tempête.
154 Cormoran huppé (*Phalacrocorax cristatus*, Vieill.), très accidentel.
155 Oie d'Egypte (*Anser Egyptianus*, Briss.), très accidentel.
Deux individus, mâle et femelle, furent tués en 1868, près Fervaques (manque en collection.)

- 156 Oie cendrée (*Anser cinereus*, Meyer), de passage.
157 — vulgaire ou sauvage (*Anser sylvestris*, Briss.), de passage.
158 Cygne sauvage (*Cygnus ferus*, Ray.), de passage dans les hivers rudes.
159 Canard souchet, v. Rouge de rivière (*Spatula clypeata*, Boie) de passage assez rarement.
160 — sauvage (*Anas boschas*, L.), de passage assez communément.
161 — pilet ou à longue queue (*Anas acuta*, L.), de passage plus rarement.
162 — sifleur, v. Vignou (*Anas penelope*, L.), de passage assez régulier.
163 Sarcelle d'hiver (*Querquedula crecca*, Steph.), de passage assez régulier.
164 — d'été, v. Craquette (*Querquedula circia*, Steph.), de passage au printemps, plus rare.
165 Fuligule garrot, v. Têtard (*Clangula glaucion*, Brehm), de passage assez ordinaire.
166 — morillon, v. Têtard (*Fuligula cristata*, Steph.), de passage assez ordinaire.
167 — eider (*Somateria mollissima*, Boie), de passage très accidentel.
Un exemplaire jeune mâle, tué en Octobre 1892, sur la *Touques*, à Coquainvillers.
168 Harle bièvre (*Mergus merganser*, L.), de passage dans les longs hivers.
169 — huppé (*Mergus serrator*, L.), de passage dans les longs hivers.
170 — piette (*Mergus albellus*, L.), de passage moins rarement.
171 Grèbe huppé, v. Plongeon (*Podiceps cristatus*, Lath.), de passage peu fréquent.
172 — castagneux, v. petit Plongeon (*Podiceps fluviatilis*, Briss.), de passage en hiver, commun.